

Coniglio *ORYCTOLAGUS CUNICULUS*



Informazioni generali

Provenienza e biologia: i conigli fanno parte della famiglia dei leporidi e discendono dal coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*), le cui origini si trovano nel sud dell'Europa, in particolar modo in Spagna.

I conigli, benché rodano, non sono roditori. Se si paragona il cranio di un coniglio con quello di un porcellino d'India, si noterà che il coniglio ha due piccoli denti, detti incisivi minori, dietro gli incisivi veri e propri; questi incisivi minori mancano nei roditori. Occorre altresì distinguere la lepre europea (*Lepus europaeus*) dal coniglio: le lepri non sono mai state addomesticate e si distinguono dai conigli nell'aspetto e nel modo di vita. Le lepri hanno una costituzione corporea più grande e più slanciata. Non scavano e non allestiscono nessuna tana, poiché i loro piccoli vengono al mondo completamente sviluppati dopo una lunga gestazione, contrariamente ai coniglietti che sono nidicoli ciechi e indifesi.

I conigli domestici attuali non discendono dalla lepre, bensì dal coniglio selvatico.

Aspettativa di vita: di regola 7 o 8 anni, al massimo 12.

Maturità sessuale: dipende molto dalla razza e dall'alimentazione. In generale interviene attorno alle 8 o 10 settimane d'età.

Periodo d'attività: in natura, i conigli sono prevalentemente attivi al crepuscolo e alternano periodi di riposo di diverse ore alle fasi d'attività.

Comportamento e anatomia

Stile di vita naturale: i conigli sono prettamente sociali e in natura vivono in gruppi famigliari e in colonie. Costruiscono sistemi di gallerie sotterranee nelle quali si rifugiano in caso di pericolo e per riposare. Queste gallerie vengono usate anche per l'allevamento dei piccoli. Nonostante l'intensa selezione, i nostri conigli domestici presentano ancora le stesse esigenze (sociali) e lo stesso comportamento dei loro congeneri selvatici!

Struttura del gruppo: i conigli sono animali sociali e non dovrebbero mai essere detenuti individualmente. Per detenerli in coppia si possono associare due femmine, due maschi castrati precocemente o un maschio castrato e una femmina. In generale, le coppie miste e i maschi castrati si tollerano meglio di due femmine non sterilizzate.

Per detenerli in gruppo possono essere considerate diverse combinazioni: un maschio castrato e da una a tre femmine, due maschi castrati e da due a quattro femmine, o un gruppo «esclusivamente maschile» con diversi maschi castrati precocemente e senza femmine.

Naturalmente, anche fra i conigli ci sono le simpatie e le antipatie di cui occorre tenere conto. Un altro aspetto da considerare è che i conigli nani sono meno tolleranti nei confronti dei gruppi delle altre razze, come ad esempio i conigli di Nuova Zelanda.

I porcellini d'India, invece, non costituiscono sostituti adeguati per fare compagnia a un singolo coniglio (come i conigli non lo sono per un singolo porcellino d'India). Certo, si possono detenere gruppi misti con almeno 2 porcellini d'India e almeno 2 conigli, purché si adempiano le esigenze di entrambe le specie animali. Ciò richiede molto spazio.

Sensi e comunicazione: grazie alle loro grandi orecchie, che funzionano come imbuto per il suono, i conigli odono molto bene. Per contro, sono anche molto sensibili ai rumori forti.

Come tipici animali fuggiaschi, i conigli sono dotati di grandi occhi disposti lateralmente sul capo; essi consentono loro di vedere a 360° ma limitano molto la loro visione tridimensionale. Gli occhi dei conigli sono molto sensibili ai movimenti. I conigli hanno un buon odorato. Questo senso molto sviluppato è importante per il comportamento sociale, poiché i conigli comunicano, fra l'altro, mediante secrezioni ghiandolari (feromoni). La testa dei conigli è dotata di vibrisse che facilitano loro l'orientamento tattile nelle gallerie e al crepuscolo.



Detenzione

Gabbie: i conigli sono animali fuggiaschi molto soggetti allo stress. È dunque importante che nella loro gabbia ci siano nascondigli a sufficienza. Inoltre, occorre almeno una zona di ritiro nell'oscurità.

Poiché ai conigli piace spiccare salti e «mettersi in piedi» per guardarsi attorno, la gabbia deve essere abbastanza alta da permettere loro di muoversi e comportarsi in questo modo. Anche le superfici sopraelevate, che occupano volentieri, consentono loro di guardarsi attorno.

Infine, la superficie di base dovrebbe essere abbastanza ampia da permettere loro di spostarsi nel modo conforme alla loro specie, con salti, balzi e compiendo scarti sui lati.

Detenzione all'aria aperta: la Protezione Svizzera degli Animali PSA raccomanda di detenere i conigli tutto l'anno in un recinto all'aria aperta, affinché gli animali abbiano abbastanza spazio e possano scavare. Le comuni gabbie per conigli, anche quelle costituite da più compartimenti, sono raramente adattate alla specie poiché non consentono ai conigli di scavare e non hanno abbastanza spazio per correre, fare scarti laterali o per raddrizzarsi sulle zampe posteriori.

La Protezione Svizzera degli Animali raccomanda una superficie minima di 6 m² per detenere dei conigli all'aria aperta, con un recinto di almeno 70 cm d'altezza; ciò basta per 2 fino a 4 individui. Se possibile, occorre però detenere questi animali in spazi più ampi.

Ci sono due tipi di recinti per la detenzione all'aria aperta: quelli fissi e quelli amovibili. I recinti fissi presentano il vantaggio di potere essere allestiti in modo sicuro nei confronti delle intrusioni e della fuga (per proteggerli dai predatori e per impedire che i conigli fuggano scavando sotto il recinto). Tuttavia, un recinto fisso non consente di cambiare pascolo e presto o tardi lo strato erboso sarà dissodato, così che lo spazio esterno sarà rapidamente infangato in caso di maltempo. Inoltre, questi recinti possono essere fortemente soggetti all'attacco di agenti patogeni che causano la diarrea.

I recinti amovibili proteggono solo in modo limitato contro i predatori come la volpe e la faina, ma consentono ai conigli di accedere regolarmente a nuovi pascoli con erba fresca; sono inoltre impeccabili dal punto di vista igienico, purché siano spostati frequentemente.

Una variante pratica e rispettosa degli animali consiste in recinti mobili che possono essere ordinati direttamente presso il fabbricante (Fondazione Silea). Si tratta delle cosiddette capanne Niesen. Consistono in una capanna amovibile con uno spazio esterno adiacente che può accogliere fino a 4 conigli di 3.5 kg. Presso lo stesso fabbricante si può ordinare anche il recinto Maxiflex. Quest'ultimo è molto facile da montare e smontare poiché può semplicemente essere piegato e spiegato.

I recinti Maxiflex possono accogliere 2 o 3 conigli nani. Chi pratica volentieri il bricolage troverà altre possibilità e idee per costruire recinti e capanne per conigli nella bibliografia indicata in calce. La fantasia dell'artigiano di casa non conosce limiti, purché la sua costruzione sia rispettosa della specie animale.

Dato che i recinti mobili non sono sicuri nei confronti della faina e della volpe, i conigli dovrebbero disporre anche di uno spazio interno (stalla) a prova di predatori e di un piccolo recinto notturno sicuro. Rinchiudere semplicemente i conigli al cadere della sera non è corretto nei confronti di questi animali, poiché sono prevalentemente attivi al crepuscolo: equivarrebbe a privarli del loro momento di massima attività.

Per detenere tutto l'anno i conigli all'aria aperta occorre almeno un locale al riparo, ben isolato e secco, ben ventilato affinché non si surriscaldi in estate e che in inverno non sia troppo freddo né umido a causa della condensazione.

Un buon riparo contro il freddo consiste in una solida capanna con pareti spesse di legno e con i box generosamente ricoperti di stame (lettoniera per bestiame minuto, paglia); più fa freddo fuori, più lo strato di lettiera dovrà essere spesso. La detenzione invernale all'aria aperta può essere praticata solo con almeno quattro conigli, affinché producano abbastanza calore corporeo da riscaldare il rifugio durante le ore notturne.

In estate è indispensabile proteggere i conigli dal caldo. Occorre che ci siano abbastanza zone all'ombra nello spazio all'aperto; alberi e arbusti sono l'ideale per crearle. Anche i tubi di cemento sono un buon accorgimento per allestire ripari all'ombra poiché rimangono freschi all'interno anche quando il sole è intenso. Evitate di coprire il recinto con coperte di lana o teli spessi, poiché provocano ristagni di calore al di sotto. È meglio ricorrere a panni chiari da tendere sopra il recinto



ZVG



BNI.CH

facendo in modo che l'aria possa circolare. Anche il rifugio per i conigli deve essere ben ventilato per evitare ristagni di calore. Occorre però evitare le correnti d'aria, poiché favoriscono l'apparire di malattie.

Detenzione nell'appartamento: la PSA vede le detenzioni in appartamento con un occhio critico, poiché solo la detenzione all'aria aperta consente ai conigli di scavare correttamente. Di regola, solo la detenzione all'aperto accorda loro spazio a sufficienza. Se tuttavia si desidera detenere di conigli in casa, occorre allestire una stanza tranquilla solo per loro. In una zona di questa stanza si sistemerà un recinto che rimarrà sempre aperto e che fungerà da area di ritiro e riposo. Conterrà della lettiera per frugare, una mangiatoia a rastrelliera per il fieno e le ciotole per il mangime e l'acqua. La «camera dei conigli» dovrà essere dotata di nascondigli e superfici sopraelevate a sufficienza, ad esempio capanne per conigli, tubi di sughero, cestini, casse, ecc. Inoltre occorre fornire loro regolarmente rami freschi da rosicchiare. È importante che i conigli non possano accedere ai cavi elettrici e che le prese di corrente siano coperte. Non bisogna lasciare mobili di valore nella camera, poiché i conigli possono danneggiarli rodendoli. Certi conigli rosicchiano anche le tappezzerie; se necessario, anche queste ultime dovrebbero dunque essere protette. Si sconsiglia di lasciare errare i conigli per tutto l'appartamento.



Sistemazione: il benessere dei conigli richiede nascondigli a sufficienza affinché possano rifugiarsi in caso di pericolo. A tale scopo si prestano tronchi cavi, rami, tubi di sughero, cestini, casse vuote, tubi di cemento oppure diverse capanne. Le casse e le capanne, oltre a fungere da rifugio e nascondiglio, servono loro anche come punti d'osservazione sopraelevati.

I conigli detenuti all'aria aperta coglieranno l'occasione per scavare gallerie che serviranno loro come nascondigli supplementari. Occorre però badare che non scavino sotto la recinzione. Ciò può essere evitato interrando la rete metallica o delle lamiere per giardinaggio tutto attorno alla recinzione. Tuttavia, questo accorgimento non esonera il detentore dal controllare regolarmente le gallerie.

È legalmente prescritto che i conigli debbano sempre avere del materiale da rodere a disposizione. Ciò serve a limare i denti e a occupare gli animali. Si prestano bene a questo scopo rami di faggio, nocciolo, betulla, abete rosso e di alberi da frutta non trattati con prodotti fitosanitari. Disponendoli nel recinto si possono anche creare nuove zone coperte e nascondigli.

Esigenze minime legali: le dimensioni minime delle gabbie sono prescritte dall'ordinanza sulla protezione degli animali e possono essere consultate online sul portale dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria. Si tenga però conto che queste norme corrispondono solo al minimo legale e non a una detenzione animale ottimale! Chi non rispetta queste disposizioni legali minime è passibile di essere punito penalmente; esse fissano dunque il limite della crudeltà nei confronti degli animali!

Le dimensioni minime in vigore per detenere conigli adulti sono indicate nella tabella contenuta nell'ordinanza sulla protezione degli animali. Per i giovani svezzati e non ancora alla maturità sessuale vigono disposizioni speciali; queste ultime possono essere consultate online sul portale dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria.

Tabella 1

Conigli adulti ^{1, 2}				
	≤ 2.3 kg	2.3-3.5 kg	3.5-5.5 kg	>5.5 kg
Dimensioni minime per parchi senza superfici sopraelevate				
Superficie di base ³ (cm ²)	3400	4800	7200	9300
Altezza ⁴ (cm)	40	50	60	60
Dimensioni minime per parchi con superfici sopraelevate				
Superficie totale ³ (superficie di base e superficie sopraelevata; cm ²)	2800	4000	6000	7800
di cui superficie minima di base (cm ²)	2000	2800	4200	5400
Altezza ⁴ (cm)	40	50	60	60
Superficie complementare per il compartimento del nido (cm ²)	800	1000	1000	1200

Commenti alla Tabella 1, secondo l'ordinanza sulla protezione degli animali:

1	Coniglie madri con figliata fino al 35° giorno di vita, maschi, coniglie senza figliata. Sul doppio della superficie minima (box doppio) può essere tenuta una coniglia con la figliata fino al 56° giorno di vita dei piccoli.
2	Non è necessario adeguare le gabbie costruite prima del 1° dicembre 1991 se hanno più dell'85 per cento della superficie di cui alla tabella 8 cifra 11.
3	Su questa superficie si possono tenere uno o due animali adulti compatibili, senza figliata.
4	Almeno il 35 per cento della superficie complessiva deve avere quest'altezza.

Tabella 2

Detenzione di conigli adulti in gruppo				
	≤ 2.3 kg	2.3-3.5 kg	3.5-5.5 kg	>5.5 kg
Dimensioni minime per parchi senza superfici sopraelevate				
3° animale (cm ² supplementari)	2278	3216	5000	11 160
4° animale (cm ² supplementari)	2278	3216	5000	11 160
5° animale (cm ² supplementari)	2278	3216	4000	11 160
ogni ulteriore animale (cm ² supplementari)	2278	3216	4000	11 160

Esempio di calcolo per conigli della categoria 2.3–3.5 kg: per 3 individui occorrono almeno 8016 cm², per 4 almeno 11 232 cm², per 5 animale almeno 14 448 cm².

Alimentazione

I conigli selvatici si nutrono prevalentemente di alimenti ricchi di fibre, ad esempio erbe, radici, cortecce e rametti. Anche i nostri conigli domestici richiedono molte fibre, per cui la loro alimentazione dovrebbe consistere soprattutto di fieno. La legge prevede che abbiano costantemente a disposizione del fieno! Esso deve essere rinnovato ogni giorno, poiché l'apparato digerente dei conigli è molto sensibile. Un fieno di buona qualità è secco, di colore verde, non ammuffisce e ha un profumo aromatico.

Si può somministrare anche del foraggio fresco (erba, dente di leone, insalate, lattuga, verza, ecc.). Tuttavia, l'erba verde fermenta rapidamente nel tratto intestinale. In primavera, i conigli devono dunque essere abituati progressivamente al foraggio fresco. Inoltre, esso dovrebbe essere somministrato solo 2 o 3 ore dopo aver somministrato del fieno, in modo da non sovraccaricare il sistema digerente.

Oltre al fieno e al foraggio verde, ogni giorno occorre dare ai conigli del materiale da rodere sotto forma di rami e rametti freschi.

I granulati sono ricchi d'energia e nella maggior parte dei casi non sono necessari, poiché i conigli ingrassano rapidamente con un eccesso di alimenti energetici. Si consiglia di somministrare granulati solo se il consumo energetico dei conigli è elevato; ad esempio in inverno, alle coniglie gravide o allattanti, agli individui in crescita o a quelli di peso insufficiente.

I conigli devono sempre potere accedere all'acqua fresca, anche quando si somministra loro del foraggio verde. Una ricerca svolta presso la clinica veterinaria di Zurigo indica che i conigli preferiscono bere da una ciotola che da una bottiglia. Le ciotole per l'acqua devono essere riempite ogni giorno e disposte in modo che i conigli non le ricoprano scavando e non le rovescino. In inverno dovrebbero essere poste all'interno, dove i conigli mantengono generalmente la temperatura sopra lo zero mediante il loro calore corporeo, in modo che l'acqua dell'abbeveratoio non geli. Se gela comunque, occorre isolare meglio la gabbia.



ISTOCK

Il pane è composto da cereali e non dovrebbe essere somministrato o solo in quantità molto limitate (ad esempio come ricompensa). Deve essere assolutamente secco ed esente da muffe. Contro il parere generale, il pane non è adatto a limare gli incisivi dei conigli e non sostituisce dunque i materiali da rodere.

Occupazione

In natura, i conigli passano gran parte del tempo a rodere e mangiare. Al fine di occuparli e di permettere loro di limarsi i denti, occorre sempre fornire loro del materiale da rodere. Si prestano bene i rami d'abete rosso, nocciolo, betulla, faggio e di alberi da frutta non trattati con pesticidi. Il comportamento naturale del coniglio include anche lo scavare. Se, nel loro recinto, gli animali non hanno un prato in cui scavare, occorre mettere a loro disposizione abbastanza lettiera affinché possano assolvere questa necessità.

La vita è bella perché è variata e anche i conigli la apprezzano così; perciò, la sistemazione del recinto dovrebbe essere cambiata regolarmente.

Contatto

I conigli sono molto sensibili allo stress. Bisogna dunque avvicinarsi lentamente a loro. Per sollevarli, si afferrino con una mano alla pelle della nuca, sostenendoli con l'altra sotto il posteriore. Non si sollevino mai i conigli per le orecchie.

È importante che i conigli non siano sollevati più spesso del necessario e che siano accarezzati solo se lo apprezzano veramente. Gli animali paurosi devono essere lasciati in pace. Se si detengono conigli come animali da compagnia per i bambini, questi ultimi devono essere adeguatamente istruiti sulla maniera responsabile di comportarsi con loro.

Riproduzione

Nei conigli la maturità sessuale dipende molto dalla razza e dall'alimentazione. In generale interviene tra 8 e 10 settimane d'età.

Le femmine possono avere più gravidanze nello stesso anno e partorire ogni volta 5–12 piccoli. Inoltre, possono essere coperte immediatamente dopo aver dato alla luce. Dato questo potenziale riproduttivo elevato, e tenendo conto che molti conigli finiscono in un rifugio per animali, la Protezione Svizzera degli Animali sconsiglia di praticare l'allevamento come hobby.

Se si detengono conigli in un gruppo misto occorre dunque imperativamente far castrare i maschi. Sterilizzare le femmine è possibile, ma si tratta di un'operazione molto invasiva; per questo motivo, di regola si castrano i maschi. Questi ultimi dovrebbero essere castrati prima di raggiungere la maturità sessuale, ossia a un'età di 8 o 10 settimane e per un peso di ca. 600 grammi. In questo modo, non acquisiscono un comportamento territoriale e si sopportano meglio fra loro.

Salute e igiene

La miglior prevenzione contro le malattie consiste a detenere i conigli in modo conforme alla loro specie e ad alimentarli correttamente. Inoltre, il loro recinto deve essere pulito regolarmente. Le ciotole per il foraggio e l'acqua devono essere pulite ogni giorno e quando sono sporcate con deiezioni. Il fieno e l'acqua devono essere rinnovati ogni giorno.

Come tutti gli altri animali domestici, i conigli devono essere osservati quotidianamente. Occorre fare particolarmente attenzione ai seguenti aspetti:

- Come si comporta ogni animale?
- Qual è la postura degli animali? Si muovono normalmente?
- Mangiano tutti? Come e quanto?
- Qual è il loro stato alimentare (magro, normale, grasso)?
- Che aspetto ha il pelame (ferite, perdita di peli, incrostazioni di feci nella regione dell'ano)?
- Che aspetto hanno il mento e gli angoli della bocca (il pelame è umido in quella zona)?
- Che aspetto hanno gli occhi e il naso (perdite, croste)?
- Qual è la lunghezza delle unghie?

I denti dei conigli crescono durante tutta la loro vita, occorre dunque controllarli regolarmente. Se non è possibile farlo da sé bisogna mostrare gli animali al veterinario una volta l'anno.

I cambiamenti devono sempre essere presi sul serio e, nel dubbio, vale la pena di rivolgersi a un veterinario specializzato in conigli.

I conigli mangiano le proprie deiezioni: si tratta di un comportamento del tutto naturale. I conigli espellono due tipi di escrementi: le tipiche caccole «da conigli», tondeggianti, piuttosto secche e dure, e le deiezioni provenienti dall'intestino cieco, umide, molli e dall'aspetto di un grappolo d'uva. I conigli mangiano queste ultime per recuperare vitamine e nutrimenti dagli alimenti predigeriti.

Gli animali manifestamente malati e che non si alimentano devono essere visitati tempestivamente da un veterinario! I conigli che non mangiano più a causa di una malattia o di problemi ai denti muoiono in poco tempo e sono dunque sempre da considerare come casi urgenti!

Vacanze

I conigli non possono essere portati in vacanza con sé, poiché il trasporto e il cambiamento d'ambiente causerebbero loro uno stress troppo intenso. Prima di acquistarli, riflettete a chi può essere d'accordo di occuparsene ogni giorno mentre voi siete in vacanza. I ragazzi non devono prendersi cura dei conigli senza la supervisione di adulti.

I «conigli sitter» devono essere istruiti tempestivamente (non solo il giorno della partenza) circa ogni singolo animale e la sua detenzione. Inoltre, devono conoscere l'indirizzo di vacanze o almeno il numero del cellulare del proprietario dei conigli e il numero di telefono dello studio veterinario. Ci sono rifugi per animali che accolgono conigli durante le vacanze, ma anche in questo caso occorre chiedere dapprima se ci sarà posto al momento opportuno. Un vantaggio del rifugio per animali è certamente l'assistenza competente, ma occorre tenere presente che i conigli vengono trasportati in un luogo sconosciuto, ciò che può causare loro un certo stress.

Acquisizione

Acquisto: chi desidera detenere conigli cercherà dapprima preferibilmente in un rifugio per animali. Ci sono molti conigli che aspettano una nuova casa. Inoltre, i conigli dei rifugi sono generalmente già castrati, vaccinati e trattati contro i vermi. Un'altra possibilità consiste a procurarsi i propri conigli presso un allevatore serio o in un negozio di animali. Gli allevatori e i negozi seri si distinguono mediante la detenzione corretta degli animali e una buona consulenza. Non acquistate in nessun caso i vostri conigli su Internet se non potete andare di persona a vedere gli animali e la detenzione.

Selezioni estreme: esiste una miriade di razze di conigli. Quelli provenienti da selezioni estreme come l'ariete inglese dalle orecchie lunghissime e penzolanti non dovrebbero essere acquisiti. Le orecchie penzolanti impediscono all'animale di comunicare e di udire correttamente. Inoltre, sono più soggette a infiammazioni e a ferite.

Per motivi di protezione degli animali si dovrebbe evitare di acquisire razze dal pelame lungo e morbido (ad esempio Teddy o Angora). I conigli il cui pelo ricade sugli occhi hanno una visione molto limitata. Ciò ha un effetto negativo sulla ricerca e l'assorbimento del cibo, sul movimento, sul comportamento di fuga e sulla comunicazione tra congeneri. Inoltre, la pelliccia lunga tende a infeltrirsi.

A causa della loro testa corta e rotonda, i conigli nani presentano problemi ai denti e al momento della nascita. Si eviti di acquistare anche questo tipo di selezioni estreme.

Bibliografia

- Morgenegg, R. (2007). Artgerechte Haltung – ein Grundrecht auch für (Zwerg-)Kaninchen. Tb-Verlag. ISBN 3-9522661-1-6
- Wegler, M. (2008). Kaninchen im Aussengehege. Gräfe und Unzer-Verlag, München. ISBN 978-3-8338-0866-1

Link

- Collocamento di animali provenienti da rifugi: www.adopt-a-pet.ch
- Consulenza, collocamento: www.nagerstation.ch
- Consulenza, collocamento, assistenza ai conigli durante le vacanze: www.kaninchenhilfe.ch
- Ordinare una capanna Niesen o un recinto Maxiflex: www.kleintierstaelle.ch
- Pagine d'informazione sulla detenzione dei conigli dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: www.blv.admin.ch > Animali > Protezione degli animali > Detenzione di animali da compagnia e animali selvatici > Conigli
- Basi legali: www.blv.admin.ch > Animali > Basi legali ed esecutive > Legislazione > Protezione degli animali > Ordinanza sulla protezione degli animali

Editore e ulteriori informazioni:

Protezione Svizzera degli Animali PSA, Dornacherstrasse 101, casella postale, 4018 Basilea,
Tel. 061 365 99 99, Fax 061 365 99 90, CCP 40-33680-3,
psa@protezione-animali.com, www.protezione-animali.com

Questo foglio informativo, e altri dello stesso tipo, possono essere scaricati su
www.protezione-animali.com/pubblicazioni